

SZEMPILLA KEZELÉS TÁJÉKOZTATÓ

Műszempilla / szempilla hosszabbítás és szempilla lifting

Vendég neve:

Kezelés dátuma:

Választott kezelés:

Szakember:

Kérlek, olvasd el figyelmesen!

A tájékoztató célja, hogy a kezelés előtt érthetően összefoglalja a szempilla hosszabbítás és a szempilla lifting menetét, az esetleges ellenjavallatokat, a kezelés előtti és utáni szabályokat, valamint az ajánlott otthoni ápolást.

Általános tudnivalók

A szempilla kezeléseket célja a természetes pillák esztétikus kiemelése, hosszabbítása, ívelése vagy sötétítése. Az eredmény és a tartósság függ a saját pillák állapotától, hosszától, sűrűségétől, a szem érzékenységétől, az otthoni ápolástól és az egyéni adottságoktól.

Szempilla hosszabbítás / műszempilla

A szempilla hosszabbítás során a saját természetes szempillákra egyenként vagy több szálból álló fanokkal műszempillák kerülnek felhelyezésre. A műszempilla nem a bőrre, hanem a saját pillaszálra kerül. A kezelés célja, hogy a saját pillák adottságaihoz illeszkedő, tartós és esztétikus eredmény készüljön.

A kezelés során a vendég csukott szemmel fekszik. A szemkörnyék megtisztítása után az alsó pillák elkülönítésre kerülnek, majd a választott technikának megfelelően történik a pillák felhelyezése. A ragasztó érzékeny vendégeknél irritációt vagy allergiás reakciót válthat ki.

Mikor nem végezhető el a műszempilla kezelés?

- aktív szemgyulladás, kötőhártya-gyulladás, szemhéjgyulladás, árpa vagy más fertőzés esetén
- szemhéjduzzanat, erős könnyezés, viszketés vagy égő érzés esetén
- friss szemészeti műtét vagy szemkörnyéki beavatkozás után
- ismert ragasztóallergia vagy korábbi erős allergiás reakció esetén
- sérült, gyulladt, hámló bőr a szemkörnyéken
- nagyon gyenge, hiányos vagy sérült saját pillák esetén
- ha a vendég nem tudja csukva tartani a szemét a kezelés alatt
- ha az állapot alapján a kezelés biztonságosan nem végezhető el

Műszempilla kezelés előtti szabályok

- A kezelésre tiszta, sminkmentes szemkörnyékkel érkezz.
- A kezelés napján ne használj szempillaspirált, szemhéjtust, olajos lemosót vagy zsíros szemkörnyékápolót.
- Kontaktlencse viselése esetén kérlek jelezd, mert a kezelés idejére szükséges lehet eltávolítani.
- Ha bármilyen szemészeti panaszod, allergiád, műtéted vagy friss irritációd volt, azt a kezelés előtt mindenképpen jelezd.

Műszempilla utóápolási szabályok

- A kezelést követő első 24 órában kerülj a vizet, gőzt, szaunát, szoláriumot és az intenzív izzadással járó tevékenységeket.
- Ne dörzsöld, ne húzogasd és ne tépkedd a pillákat.
- Kerüld az olajos lemosókat és zsíros szemkörnyékápolókat.
- Ne használj vízálló szempillaspirált.
- Naponta finoman tisztítsd a pillákat erre alkalmas szempilla samponnal.
- Fésüld át őket tiszta spirálkefével.
- Ne aludj arccal a párnába nyomva.
- Töltésre általában 2-4 hetente érdemes érkezni, a saját pillaciklustól és ápolástól függően.

Ajánlott otthoni termékek műszempillához

- olajmentes szempilla sampon
- puha tisztítóecset
- tiszta spirálkefe
- olajmentes sminklemosó
- kímélő, szemkörnyékre alkalmas arctisztító

Kerülendő termékek műszempillánál

- olajos lemosó
- zsíros szemkörnyékápoló
- vízálló szempillaspirál
- szemhéjra kent nehéz olajos termékek
- házi ragasztóoldás vagy pillák tépkedése

Szempilla lifting

A szempilla lifting a saját természetes pillák ívelésére szolgáló kezelés. A kezelés során a saját pillák egy szilikonpadra kerülnek, majd speciális lifting anyagok segítségével új ívet kapnak. A kezelés igény szerint festéssel is kiegészíthető. A lifting nem hosszabbítja meg a pillát, hanem a saját pillaszálakat emeli és íveli, ezért az eredmény a saját pilla hosszától, sűrűségétől és állapotától függ.

A lifting menete

A kezelés előtt a szemkörnyék tisztítása történik, majd az alsó pillák elkülönítésre kerülnek. A megfelelő méretű szilikonpad kiválasztása után a pillák felrögzítésre kerülnek, majd a lifting anyagok a szakmai protokoll szerinti hatóidővel hatnak. Ezt követheti fixálás, ápoló anyag, illetve festés. A kezelés végén a pillák rendezésre kerülnek, és megbeszéljük az otthoni ápolási szabályokat.

Mikor nem végezhető el a szempilla lifting?

- aktív szemgyulladás, árpa, kötőhártya-gyulladás vagy szemhéjgyulladás esetén
- friss szemészeti műtét vagy szemkörnyéki beavatkozás után
- erősen könnyező, irritált vagy viszkető szem esetén
- sérült, nagyon gyenge vagy töredezett saját pillák esetén
- ismert allergia esetén lifting anyagra, festékre vagy ragasztóanyagra
- szemkörnyéki seb, duzzanat, hámlás vagy irritáció esetén
- ha a vendég nem tudja csukva tartani a szemét a kezelés alatt

Szempilla lifting előtti szabályok

- A kezelésre sminkmentes szemmel érkezz.
- A kezelés napján ne használj szempillaspirált, vízálló sminket, olajos lemosót vagy zsíros szemkörnyékápolót.
- Kontaktlencse esetén kérlek jelezd, és szükség esetén a kezelés idejére távolítsd el.
- Ha a szemed érzékeny, könnyezik, gyulladt, vagy nemrég volt szemészeti műtéted, azt mindenképpen jelezd.

Szempilla lifting utáni szabályok

A kezelés utáni első 24 órában:

- ne érje víz a pillákat
- kerüld a gőzt, szaunát és forró fürdőt
- ne használj szempillaspirált
- ne dörzsöld a szemed
- ne aludj arccal a párnába nyomva
- ne használj olajos vagy erős szemkörnyéki termékeket

Az első 24 óra után:

- naponta finoman fésüld át a pillákat tiszta spirálkefével
- használhatsz szempillaápoló szérumot vagy kondicionálót
- kerüld a pillák durva dörzsölését
- vízálló szempillaspirált lehetőség szerint ne használj rendszeresen
- új liftinget általában csak a pillák regenerálódása után érdemes kérni

Ajánlott otthoni termékek lifting után

- szempillaápoló / keratinos ápoló szérum
- kímélő, olajmentes sminklemosó
- tiszta spirálkefe
- gyengéd arctisztító
- szemkörnyékre alkalmas hidratáló, ha nem kerül közvetlenül a pillákra az első 24 órában

Kerülendő termékek lifting után

- vízálló szempillaspirál gyakori használata
- erős dörzsölés
- szempilla göndörítő használata közvetlenül lifting után
- olajos termékek az első 24 órában
- otthoni vegyszeres újraliftingelés

Lehetséges reakciók

Mind a műszempilla, mind a lifting esetén előfordulhat egyéni érzékenység. Ilyen lehet például:

- enyhe pirosság
- könnyezés
- viszketés
- húzódo érzés
- szemhéjduzzanat
- irritáció
- allergiás reakció

Fontos!

Erős fájdalom, jelentős duzzanat, romló látás, gennyes váladékozás vagy tartós panasz esetén orvosi / szemészeti vizsgálat javasolt.

Vendég nyilatkozata

Kijelentem, hogy a szempilla hosszabbításról / műszempilláról és a szempilla liftingről szóló tájékoztatót elolvastam, megértettem. A kezelés menetéről, lehetséges reakcióiról, ellenjavallatairól és az otthoni ápolási szabályokról tájékoztatást kaptam. Minden ismert allergiáról, érzékenységről, szemészeti panaszról, műtétről, árpáról vagy egyéb fontos egészségügyi körülményről tájékoztattam a szakembert. Tudomásul veszem, hogy az eredmény és a tartósság függ a saját pilláim állapotától, az egyéni adottságaimtól és az otthoni ápolás betartásától.

Vendég neve:

.....

Dátum:

.....

Aláírás:

.....